

# حقائق سريعة السكة الذهبية



يمكن أن تصبح الأنواع التي يشتهر تواجدها في أحواض السمك والبرك المائية غازية إذا تم إدخالها إلى البرية. بمجرد إطلاق هذه الأنواع، يمكنها أن تتفوق على الأنواع المحلية في الحصول على الغذاء والموتل، وتقلل من وضوح المياه، وتنتشر الأمراض إلى الأنواع المحلية.

## تجنب إطلاقها في البرية!

إليك كيفية المساعدة في منع انتشار الأسماك الذهبية والأنواع الأخرى التي يشتهر تواجدها في أحواض السمك:

١. **توقف عن نشرها!** تجنب تمامًا تصريف مياه أحواض السمك أو البرك المنزلية أو النباتات أو الحيوانات، سواء كانت حية أو ميتة، في المسطحات المائية.
٢. **انتبه!** تعهد بالتواصل مع شخص لتبني حيوانك الأليف أو نباتك أو إعادته إلى المتجر، وتصرف بمسؤولية من خلال إجراء بحث قبل التبني، من أجل الإبلاغ عن أي أنواع مثيرة للقلق إلى EDDmaps، وإنهاء الملكية بالدفن لتجنب انتقال الأمراض، أو الاتصال بالطبيب البيطري.
٣. **الإبلاغ!** إذا لاحظت وجودًا للسكة الذهبية، فأبلغ عن ذلك عبر تطبيق EDDMapS، أو عن طريق الاتصال بالرقم 1-855-336-BOAT (2628).
٤. **التعرف على القانون!** يحظر القانون في ألبرتا استخدام أسماك كقطع حي ونقل الأسماك من مسطح مائي إلى آخر. يمكن أن تصل العقوبات المفروضة على نقل الأسماك بشكل غير قانوني إلى ١٠٠ ألف دولار والسجن لمدة عام أو أحدهما.

أنا أنتهي إلى  
الحوض!





السمة الذهبية، كاراسيوس أوراتومس

## السمة الذهبية حقائق سريعة:

- تعيش الأسماك الذهبية في شرق آسيا وتم طرحها كأسماك للزينة والتربية؛ ومع ذلك، فقد تم إطلاق بعضها في البرك والمسطحات المائية الاصطناعية.
- تتميز الأسماك الذهبية بلونها البرتقالي الذهبي، وهي قد تكون أيضًا بلون زيتوني برونزي مائل إلى الأبيض الفضي. وهي تتميز بغم بارز وشوكة صلبة مسننة في هيكل الزعنفة الظهرية والشرجية.
- وهي تتكاثر بعد عام واحد ويمكنها وضع ما بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ بيضة، حتى ٣ مرات في السنة. ويصل متوسط عمرها إلى ٤٠ عامًا.
- تُمثل الأسماك الذهبية أحد الأنواع العامة ويمكنها التأقلم مع مجموعة واسعة من الظروف البيئية، مثل المياه شديدة التعكر والغنية بالمغذيات مع القليل من الأكسجين أو بدونه. بمجرد إخراجها من الأحواض، يمكنها أن تنمو لحجم أكبر بكثير مما هي عليه (بحجم كرة القدم أو طبق العشاء!).
- وهي قد تؤثر على أعداد الأسماك الأصلية وموائلها الطبيعية، كما يمكن أن تحد من توافر الغذاء من خلال المنافسة والافتراس. ويمكنها كذلك أن تكون حاملة للعديد من مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية التي تصيب الأسماك.
- قد تؤثر حالات العدوى من الأسماك الذهبية على جودة المياه من خلال زيادة تعكرها بسبب عاداتها الغذائية وزيادة خطر نمو الطحالب نتيجة لنمو البكتيريا الزرقاء في أمعائها.
- قد يكون التحكم في السمة الذهبية أمرًا صعبًا بمجرد انتشارها، مما يتطلب بذل جهود كبيرة. وتشمل طرق السيطرة أو التخلص، التي تتم بواسطة أفراد مدربين، سحب المياه، واستخدام الشباك، والاستعانة بالمواد العلاجية الكيميائية.
- تنتشر الأسماك الذهبية على نطاق واسع في ألبرتا في أكثر من ١٠٠ موقع معروف، ويقع بعضها يقع في أقصى الشمال مثل مدينة فورت ماكموري.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [ABINVASIVES.CA](http://ABINVASIVES.CA)